

# Testy alergologiczne

Kiedy pojawia się alergia, mamy i lekarze dążą do rozpoznania przyczyny, znalezienia winowajcy – alergenu. Mamom małych alergików często proponuje się wykonanie testów.

## CZYM JEST ALERGIA?

Alergia to nieprawidłowa odpowiedź układu immunologicznego na obce gatunkowo białko (przypominam laktoza jest cukrem, gluten jest białkiem). Białko jest składowa wszystkich organizmów żywych, oznacza to, że każdy organizm może powodować alergię.

Jako żywe organizmy rozumiemy: bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty, rośliny oraz zwierzęta. Każdy żywy organizm może spowodować odpowiedź immunologiczną o różnym charakterze (Objawy alergii u niemowląt).

**POZYTYWNY WYNIK TESTU JEDYNIĘ ŚWIADCZY O MOŻLIWEJ REAKCJI.**

**W PRZYPADKU TESTU IMMUNOGLOBULINY E ŚWIADCZY O OBECNOŚCI SWOISTYCH PRZECIWCIAŁ ODPORNOŚCIOWYCH W KIERUNKU KONKRETNÝCH ALERGENÓW, A NIE MUSI TO TOWARZYSZYĆ AKTYWNYM OBJAWOM ALERGII.**

**ODWROTNIE NEGATYWNY WYNIK TESTU NIE OZNACZA BRAKU ALERGII. W PRZYPADKU DZIECI PONIŻEJ 3-4 ROKU ŻYCIA TESTY ZWYKLE SĄ FAŁSZYWIE UJEMNE, CZYLI NIE WYKAZUJĄ ŻADNYCH ODCZYNÓW ALERGICZNYCH, CZYLI POZIOMY IgE W NORMIE, POMIMO ROZLEGŁYCH ZMIAN ALERGICZNYCH.**

**JAKIE MAMY DOSTĘPNE RODZAJE TESTÓW?**



źródło: [www.verywell.com](http://www.verywell.com)

## **Testy z krwi (nie wymaga odstawienia leków przeciwhistaminowych)**

Test polega na pobraniu próbki krwi z żyły do probówki. Następnie oddziela się elementy morfotyczne krwi od surowicy (płynu w którym są zawieszone krwinki, przeciwciała itp). W surowicy oznacza się poziom przeciwciał przeciwko konkretnemu alergenów. Ponieważ oznaczamy p/ciała nie ma potrzeby przerywania podawania leków przeciwhistaminowych, gdyż te leki nie mają wpływu na poziom p/ciał.

Do rozpoznania alergii oznacza się poziom przeciwciał IgE. Przeciwciała IgE są silnie powiązane z alergiami oraz inwazją pasożytów.



źródło: BD Vacutainer® UltraTouch™  
Push Button Blood Collection Set

Popularne w ostatnich latach oznaczanie przeciwciała IgG nie jest wiarygodną metodą. Przeciwciała IgG, odpowiedzialne są za pamięć immunologiczną, są matrycą do namnażania p/ciał w przypadku infekcji. Przeciwciała IgG wykorzystane są przy

uodpornieniach swoistych (szczepienia ochronne). W przypadku podejrzenia niektórych chorób (borelioza, różyczka, toksoplazmoza) oznacza się przeciwciała IgG i IgM, aby

Tą metodą oznacza się alergię pokarmową i wziewną, są też testy screeningowe, czyli odczynnik zawiera antygeny różnych alergenów z danej grupy, np: owoce morza, chwasty, wymienione poszczególne gatunki, ale wynik dotyczy całej grupy, a nie poszczególnych gatunków. Jeśli wyjdzie wynik dodatni, należy ostrożnie podchodzić. Wyniki klas swoistych IgE świadczą o prawdopodobieństwie wystąpienia reakcji anafilaktycznej.

#### Normy wyników – immunologia

| WYNIKI IgE SWOISTE (KUA/I) |          |  |  |
|----------------------------|----------|--|--|
| Klasa                      | Stężenie | Wynik                                      | Prawdopodobieństwo wystąpienia anafilaksji |
| 0                          | <0,35    | brak swoistych IgE (atopia wątpliwa)       | 20%  |
| 1                          | 0,35-0,7 | b. mało swoistych IgE (atopia możliwa)     | 30%  |
| 2                          | 0,7-3,5  | mało swoistych IgE (pozytywny)             | 40%  |
| 3                          | 3,5-17,5 | średni poziom swoistych IgE (pozytywny)    | 50%  |
| 4                          | 17,5-50  | duży poziom swoistych IgE (pozytywny)      | 60%  |
| 5                          | 50-100   | wysoki poziom swoistych IgE (pozytywny)    | 70%  |
| 6                          | >100     | b. wysoki poziom swoistych IgE (pozytywny) | 80%  |

**Testy skórne (wymaga odstawienia leków przeciwhistaminowych na 2 tyg przed wykonaniem testów)**



źródło: Healthline

Testy punktowe. Polegają na umieszczeniu na skórze kropli płynu zawierającego skoncentrowany alergen. Następnie nakłuwana się skórę jednorazową igłą, każda kropla osobną. np 14 kropli to 14 igieł.

Jako pierwsze umieszcza się krople potwierdzające prawidłowy przebieg testu, tzw kontrola dodatnia (histamina) i kontrola ujemna (roztwór soli fizjologicznej NaCl 0,9%)

Specyficzną odmianą tego testu jest tzw. **test natywny**. Polega na umieszczeniu na skórze substancji alergizującej w naturalnej formie, np: mleko kozie, sok pomarańczowy etc. reszta testu przebiega podobnie jak w przypadku preparatu gotowego.

Następnie należy odczekać 10 min, zgłosić się do punktu w celu usunięcia płynu i odczekać kolejne 10 min. Po 20 minutach należy odczytać wynik z wykorzystaniem specjalnego szablonu. W teście oznacza się reakcje histaminowa w skórze. Oznaczana jest średnica miejscowego odczynu alergicznego wokół nakłucia. Rozróżniamy średnicę miejscowego obrzęku skóry (tzw pęcherzyk), oraz rumień wokół. Im większy odczyn tym wyższe prawdopodobieństwo alergii.



koncentraty alergenów  
źródło: Melbourne Paediatric and Allergy  
Centre



nakłuwacze  
źródło: ResearchGate




odczyt źródło:  
<http://www.alergologia.com.pl/testy-i-badania>  
aż




nakładanie testu na skórę  
źródło:  
<http://henriguilbert.com/alergeny-pokarmowe.html>

**Testy płatkowe (wymaga odstawienia leków przeciwhistaminowych)**

na 2 tyg przed wykonaniem testów)



płytką do odczytu  
testu płatkowego  
źródło:  
chemotechnique.pl



Ostatnia odmiana testów. Polega na umieszczeniu w specjalnym „naparstku” żelu z alergenem. Wszystkie „naparstki” umieszcza się na plastrze a następnie przykleja cały pasek na skórę pleców. Alergeny oznaczane w tym teście to głównie: metal, składniki kosmetyków, antybiotyki.

Test trwa ok 5 dni:

- pierwszego dnia test przykleja się na skórę.
- trzeciego dnia zdejmuje się test i odczytuje pierwszy wynik
- piątego dnia ponownie odczytuje się wynik

**!!! WAŻNE !!!**

**ŻADEN TEST ALERGOLOGICZNY NIE JEST  
WYZNACZNIKIEM ALERGII  
I NIE DETERMINUJE WYSTĄPIENIA  
OBJAWÓW.**

**TESTY ALERGICZNE SĄ JEDYNIIE WSKAZÓWKA,  
GDZIE EWENTUALNIE MOŻNA SZUKAĆ I NA CO  
ZWRÓCIĆ UWAGĘ.**

**Jedynym skutecznym sposobem  
diagnostyki u niemowląt jest  
OBSERWACJA**

obrazek w nagłówku: [SnackSafely.com](https://www.SnackSafely.com)